

AK Botanik-Exkursion am 13.7.18: Rebland/Böschungen in Ihringen („Schlichten“)

Es war wieder heiß, aber vom Bahnhof zum Einstieg beim Friedhof musste niemand laufen. Die Motivation der 6 Teilnehmer wurde durch die Aussicht auf die abschließende Einkehr in der Eisdielen hochgehalten ...

Allerdings wurde es 20 Uhr, bis wir dort ankamen – es gab viel zu sehen!

- *Melica ciliata*, das Wimper-Perlgras, mit seiner dichten, strohgelben Rispe fiel als erstes auf.
- *Asparagus officinalis* (Spargel), riesige *Conyza canadensis*, die unvermeidlichen *Erigeron annuus* und *Torilis japonica*, der gewöhnliche Klettenkerbel bildeten neben *Urtica dioica* (Brennnessel), *Oenothera spec.* und *Cirsium vulgare* den Aspekt der Hohlwegböschungen.
- *Solidago canadensis*; Kanad. Goldrute; zumindest in der oberen Hälfte behaarter, grüner Stängel, unscheinbare Zungenblüten (meist gerollt), Bl. o.seits rau, Rippen eingesenkt; vgl. *Solidago gigantea* (Riesengoldrute): Stängel rötlich, kahl, grau bereift; Bl. o.seits glatt; Zungenblüten deutlich länger als Röhrenbl.
- *Phytolacca americana*; Kermesbeere; Neophyt, im Kaiserstuhl früher zum Färben von Rotwein angebaut
- *Daucus carota*; Wilde Möhre; hat nicht immer die bekannte dunkle Mittelblüte!
- *Silene latifolia*; Weiße Lichtnelke; grundst. Rosette, B getrenntgeschl., tagsüber offen, mit Nebenkronen; Verwechslungsart: *S. noctiflora*; Acker-Leimkraut; ohne Rosette, Stängel u. Kelch stark behaart u. stark klebrig; B gehen erst abends auf, alle zwittrig; Kapsel mit 6 Zähnen (*S. latifolia* 10 Zähne)
- *Melilotus albus*; Weißer Steinklee; *Melilotus officinalis*; Gelber Steinklee;
- *Papaver dubium*, *Origanum vulgare*, *Mercurialis annua*, *Artemisia vulgaris*, *Knautia arvensis*, *Galium album*
- *Centaurea stoebe*; Rispenflockenblume; viele kl. Blütenköpfe, 1 schon unten verzweigender Stängel; Bl. fiederteilig, graufilzig, m. schmalen Zipfeln; schwarzes, gewimpertes Anhängsel läuft an den Hüllbl. seitlich etwas herunter;
- *Centaurea scabiosa*; Skabiosen-Flockenblume; Große (>12mm) kugelige Köpfe, Anhängsel ähnl. wie bei *C. stoebe*; St.bl. fiederschnittig, grün, m. viel breiteren Zipfeln; abgeblüht bildet sich um die Früchte ein flacher Teller aus silbrig-gelb glänzenden Hüllblättchen aus; Pappus min. so lang wie Frucht;
- *Centaurea jacea* subsp. *jacea*; Wiesen-Flockenblume; Bl. grün, ellipt. – eilanzettlich; Anhängsel häutig, unregelm. zerschlitzt; abgeblüht ein walzliches, braunes Tönnchen aus den vertrockneten Hüllbl., Früchte ohne Pappus od. mit wenigen Pappusbörstchen;
- *Centaurea jacea* subsp. *angustifolia*; = *C. pannonica*; Schmalblättrige Wiesen-Flockenblume; Bl. schmal, aber nicht pfriemlich, wie Stängel weißfilzig behaart; spät blühend (als einzige jetzt noch mehrheitl. in Knospe; Anhängsel hellbraun, die unteren regelm. gewimpert;
- *Achillea millefolium* (*A. nobilis* war nicht dabei: hätte nur 5-10 Fiedern an den Stängelbl., Blattspindel gezähnt); Gewöhnliche Schafgarbe (*A. millefolium* agg.) bildet eine Artengruppe mit viel länglicheren und am Stängel auch schmaleren Blättern als *A. nobilis*, immer > 10 Fiederpaare an den Stängelbl.
- *Amaranthus spec.*; Fuchsschwanz, Amaranth; grünährig – wohl *A. retroflexus* (Rauhaar. Fuchsschwanz)- ?
- *Hordeum murinum*, *Bromus inermis*, *Bromus sterilis*; *Arctium lappa*, *Picris hieracoides*, *Inula conyzae*;
- *Diploaxis tenuifolia*; Schmalblättriger Doppelsame; Wildform von Rucola; charakterist. Geruch
- *Campanula rapunculus*; Rapunzel-Glockenblume; Wurzel als „Natur-Kaugummi“ verwendbar
- *Galium verum*; Echtes Labkraut; gelbe B., Blätter nadelförmig, Stängel rund, Pfl. m. Honiggeruch
- *Stachys recta*; Aufrechter Ziest;
- *Teucrium chamaedris*; Edelgamander
- *Saponaria officinalis*; Seifenkraut; abgeblüht große, aufrecht stehende Kapseln (Form v. Jonglierkeulen)
- *Dipsacus fullonum*; Wilde Karde; Bl. ganzrandig; *Dipsacus laciniatus*; Schlitzblättrige Karde; selten, in Wärmegebieten; selten auch weißblütig wie hier! (normal lila)
- *Digitaria sanguinalis*; Blutrote Fingerhirse; Fingerähren entspringen nicht alle aus einem Punkt wie bei *Cynodon dactylon*! Ährchen paarweise kurz-/langgestielt; Ligula häutig, kurz; Blattscheiden u. Bl. (zumindest die oberen) immer behaart, Ährchen kurz behaart; Bl. unterseits gekielt
- *Verbascum lychnitis*; Mehliges Königskerze; stark verzweigt – „Kandelaberform“; B. weiß oder gelb; alle Staubfäden weißwollig; Bl. u.seits mehlig bestäubt, oben kahl oder kurz behaart
- *Falcaria vulgaris*; Gewöhnliche Sichelmöhre; scharf gesägte, graugrüne Blätter (s. Foto)
- *Verbena officinalis*; Echtes Eisenkraut; *Lotus corniculatus*; Hornklee; *Medicago sativa*; Saat-Luzerne
- *Colutea arborescens*; Blasenstrauch; mediterranes Florenelement
- *Allium oleraceum*; Gemüselauch; Hochblätter sehr langspitzig; Bl. schmecken kohlig
- Fruchtstände von *Isatis tinctoria*, *Rhinanthus alectorolophus*, *Tragopogon dubius*, *Malva moschata*